



La mappa del Radon


La concentrazione di radon all'interno degli edifici dipende principalmente dal tipo di suolo e dai materiali da costruzione utilizzati.

Da uno studio pubblicato nel 1996 sulla rivista scientifica Health Physics emerge che le regioni a più alta concentrazione di radon sono il Lazio e la Lombardia, mentre le regioni a più bassa concentrazione sono la Liguria, le Marche e la Basilicata. Non si hanno dati per quanto riguarda Calabria e Sicilia.

Ricordiamo che le mappe finora prodotte non hanno rilievo ai sensi del D. Lgs. 241/2000, in quanto la prevista Commissione Tecnica non ha ancora provveduto ad emanare i criteri di classificazione delle aree. Le mappe hanno quindi un valore indicativo, e sono comunque utili per valutare fin da subito eventuali azioni a tutela della salute delle persone.

Per approfondimenti sulle varie regioni seguite i collegamenti seguenti, sottolineando che ogni Ente ha, in attesa dei criteri nazionali, adottato propri criteri di valutazione e quindi le mappe non sono immediatamente confrontabili.

CONCENTRAZIONE DI RADON (Bq/m⁻³)





U-SERIES

Via Ferrarese, 131 - 40128 Bologna
Tel: +39 051 6312418
email: info@u-series.com